

#44423 - Fentanyl med fargebakgrunn (1)

Legemiddelform: Injeksjonsløsning 50 mikrogram/ml ($\mu\text{g/ml}$), ampulle à 2 ml



Indikasjoner

- Sterke smerter
- Akutt koronarsyndrom
- Lungeødem
- Sedasjon av intuberte pasienter etter ROSC



Kontraindikasjoner

- Ved respirasjonsfrekvens under 10/min (voksne), 20/min (barn før pubertet)
- Hypotensjon med sirkulasjonspåvirkning/utblødd
- Hodeskade med GCS under 14
- Fødselssmerter
- Under 1 år/10 kg
- Myastenia gravis
- Bruk av MAO-hemmere



Konsultasjon

- Ved sedasjon
- Graviditet i første trimester



Dosering og administrasjon

Voksne

- **IV/IO:** Startdose 0,5–1 µg/kg, gjentas hver 2–3 min (maksimal enkeltdose 100 µg, totaldose 3 µg/kg).
- **Nasalt:** 0,5–1 µg/kg fordelt i begge nesebor, gjentas etter 30 min.

Vekt	mg	ml
20-40 kg	10	10
41-60 kg	20	20
61-80 kg	30	30
over 80 kg	40	40

Barn

- IV/IO: 0,5–1 µg/kg, maks 3 µg/kg.
- Nasalt: 0,5–1 µg/kg fordelt i begge nesebor, gjentas etter 30 min

Vekt	mg	ml
0-5 kg	1	1
6-10 kg	2	2
11-15 kg	3	3
16-20 kg	4	4



Spesielle hensyn

- Overvåk alle pasienter som får opioider
- Vær spesielt forsiktig ved
 - hodeskade
 - redusert bevissthet
 - eldre
 - respirasjonsdepresjon
 - hurtig administrasjon (fare for "stiff chest")